

Information für Patienten nach einer Impfung gegen Covid-19

Sie sind geimpft. Können Sie andere Menschen mit Covid-19 anstecken?

Die Impfung schützt Sie vor Covid-19. Der maximale Impfschutz wird 7-10 Tage nach der zweiten Impfung erreicht. Man weiss aber noch nicht sicher, ob die Impfung eine Ansteckung verhindert. Es kann also sein, dass Sie trotz Impfung und ohne Symptome andere Menschen anstecken. Halten Sie sich deshalb weiter an die Hygiene- und Verhaltensregeln.

Wie lange hält der Impfschutz?

Das weiss man noch nicht. Im Moment untersuchen die Hersteller, wie lange die Impfung schützt. Es kann sein, dass wir nach einer bestimmten Zeit nochmals eine Impfung empfehlen.

Können Sie durch die Impfung Covid-19 bekommen?

Nein. Sie bekommen durch die Impfung kein Covid-19. Im Impfstoff gibt es keine Coronaviren.

Gibt es Nebenwirkungen?

Bei jeder Impfung kann es Nebenwirkungen geben. Meistens sind sie schwach und gehen schnell vorbei. Sehr selten gibt es schwere Nebenwirkungen (schwere allergische Reaktionen treten innerhalb von 15 Minuten nach der Impfung auf).

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Die Einstichstelle rötet sich, schmerzt oder ist geschwollen. Dazu können Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, allgemeine Symptome wie Schüttelfrost, Fiebergefühl oder leichtes Fieber kommen.

Mit einer Verzögerung von 7-10 Tagen kann es zu einer schmerzhaften Schwellung und Verfärbung der Einstichstelle kommen (Covid-Arm). Dies ist ungefährlich und kann mit Mitteln aus der Hausapotheke behandelt werden (kühlende Salbe).

Leichte Nebenwirkungen treten nach Impfungen häufig auf. Sie zeigen, dass der Körper den Impfschutz aufbaut. Sie sind also in milder Form auch ein gutes Zeichen.

Bei einer allergischen Reaktion kommt es oft zu Schwellung, Rötung, Juckreiz oder Atemnot. Wenden Sie sich bei solchen Symptomen sofort an uns.

Was können Sie selber gegen eine Impfreaktion tun?

Oft hilft schon ein Eisbeutel/Cold Pack auf der Einstichstelle gegen die lokalen Schmerzen. Genau wie bei einer Grippe können Sie Beschwerden mit Mitteln aus der Hausapotheke behandeln (Dafalgan). Bei Unsicherheit nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Was müssen Sie nach der ersten Impfung tun?

Denken Sie daran, dass Sie noch eine 2. Impfung brauchen. Den Termin dafür sollten Sie bereits erhalten haben.

Bitte beachten Sie, dass der maximale Impfschutz erst nach 7-10 Tage nach der 2. Impfung aufgebaut ist. Halten Sie sich deshalb weiterhin an die Hygiene- und Verhaltensregeln.

Haben Sie sich online für eine Covid-Impfung in einem Impfzenter registriert?

Um administrative Aufwände zu minimieren, melden Sie sich bitte per Mail für die Covid-Impfung in einem Impfzenter ab (auch wenn Sie noch keinen Termin erhalten haben!).

→ covid-19-impfung@ag.ch